



Gerichte, Regierungen, Bahnvorstand, alle mal herh ren:

## Description

# Maskentragen ist gesundheitssch dlich â?? eine neue Meta-Analyse an insgesamt 37 Studien belegt dies

Rechtzeitig vor Weihnachten hat die Arbeitsgruppe um Kai Kisielinski und Andreas S nnichsen eine Meta-Analyse [auf dem Preprint-Server Research Square bereitgestellt](#) [1], die klar belegt, dass Maskentragen sch dliche Gesundheitseffekte hat. Das sollten Sie, liebe Richter, liebe Mitglieder von Regierungen, Ordnungs mtern, Schulleitungen, Verantwortliche bei der Bahn in Rechnung stellen, wenn Sie weiterhin das Tragen von Masken verpflichtend machen. Denn Sie machen sich strafbar wegen K rperverletzung. Die Meta-Analyse zeigt: *in allen untersuchten Parametern, die physiologische Indikatoren f r Gesundheitsbelastung darstellen, f hrt das Tragen von Gesichtsmasken zu relativ gro en, signifikanten und sch dlichen Effekten.*

Das Tragen von Masken wurde zum apotrop ischen Zeichen [\[1\]](#), also zum  bel abwendenden Ritual in Zeiten von Corona. Man dachte, man k nne damit das Virus bannen und t te den Menschen etwas Gutes. Maskentragen ist zweifellos ein Ritual der Selbstwirksamkeit, wie ich in meinem [Blog zum Bericht  ber das MWGFD-Maskensymposium](#) und meinem [Maskenblog im Oktober](#) bereits ausf hrlich erl utert habe. Aber es ist eines, das hohe Kosten verursacht.

Diese Kosten werden jetzt von dieser Meta-Analyse klar benannt und quantifiziert. Andreas S nnichsen hatte sie auf dem Maskensymposium der MWGFD bereits vorgestellt. Die Meta-Analyse schloss nach einer ausf hrlichen Literatursuche 54 Studien in die Betrachtung ein, von denen 37 Studien f r eine quantitative Zusammenfassung zur Verf gung standen. Bevor ich zu den Ergebnissen komme, folgen zun chst ein paar *methodische Erl uterungen* f r diejenigen Leserinnen und Leser, die die entsprechende Terminologie weniger gut kennen. Ich habe die Methodik von Meta-Analysen [in meinem Methodenblog](#) ausf hrlicher besprochen.

## Methodische Erl uterungen zur Meta-Analyse

Ein **systematischer Review** ist eine Zusammenfassung von bereits vorliegenden Studien. Er unterscheidet sich von einem narrativen oder unsystematischen Review vor allem darin, dass die Suchstrategie nach Studien klar

definiert ist und dadurch jederzeit reproduziert oder später auch erweitert werden kann. Ein narrativer Review ist das, [was ich produziert habe](#): eine Zusammenfassung von wichtigen Ergebnissen, die nicht notwendigerweise alle Information zusammenzieht, sondern die wichtigen und methodisch zuverlässigeren, und sie gewichtet.

Eine **Meta-Analyse** ist eine quantitative, statistische Zusammenfassung von Studien. Die Idee dahinter ist einfach: Einzelne Studien haben oft unklare Ergebnisse oder widersprechen sich. Das mag daran liegen, dass sie unterschiedlich viele Personen eingeschlossen haben, dass zufällig ein Fehler entsteht, dass eine Studie einen systematischen Fehler gemacht hat, und vieles andere mehr. Daher ist eine quantitative Zusammenfassung aller Studien immer sicherer und robuster, als wenn man nur eine oder weniger Studien verwenden würde. Das ist der Grund, weswegen in der methodischen Hierarchie der "Evidence Based Medicine" Meta-Analysen ganz oben stehen. Denn ihre Ergebnisse sind zuverlässiger, jedenfalls in der Regel und meistens. Es gibt eine bereits lang andauernde fachliche Diskussion darüber, ob einzelne, große und gute Studien nicht besser wären. Aber meistens kann man auch gegen noch so große und noch so gute Studien Kritik ins Feld führen, was dann zu weiteren Studien Anlass gibt, und so fort. Da sind Meta-Analysen, die eine Zusammenfassung liefern, auf jeden Fall schon pragmatisch gesehen natürlich, auch wenn sie eine Diskussion selten endgültig beenden werden. Denn es können ja weitere Studien hinzukommen. Allerdings ist dann, wenn die meisten Studien in dieselbe Richtung weisen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Studie alles umkehrt, umso geringer, je mehr Studien vorher in eine Richtung zeigen. Und das ist hier aus meiner Sicht in der Tat so.

## Nebenwirkungen von Maskentragen – Die Ergebnisse der Meta-Analyse

In dieser Meta-Analyse wurden Studien zusammengefasst, die physiologische Werte beim Tragen von Gesichtsmasken gemessen haben. Diese Werte geben Auskunft über mögliche physiologische Beeinträchtigungen und auch Symptome. Die Metrik, die die Autoren gewählt haben, ist die sog. standardisierte Mittelwertsdifferenz ("smd" oder "d" abgeleitet). Das ist eine Metrik, die einen Vergleich von Effekten über Studien hinweg erlaubt. Ich habe das in meinem [Methodenblog zur Meta-Analyse](#) erläutert und fasse mich daher hier kurz. Diese Metrik drückt in den Einheiten einer Standardabweichung der Standardnormalverteilung, also dimensionslos, aus, wie groß ein Unterschied oder ein Effekt in irgendeiner Größe ist, verglichen mit einer Kontrollbedingung.

Zur Einschätzung kann man sich folgendes merken. Ich gebe auch die sog. "number needed to treat" (NNT) an, das ist die Anzahl von Menschen, die man behandeln muss, um einen Effekt zu sehen (sowie sie von Kraemer und Kupfer 2006 publiziert wurden [2]):

$d < 0.3$ : etwa eine Drittelstandardabweichung Unterschied, kleiner Effekt; NNT: ca. 6

$d > 0.3$  und  $< 0.6$ : mittelgroßer Effekt; NNT: 3-5

$d > 0.6$ : großer Effekt: NNT  $< 3$

Mit dieser Information sind wir gerüstet, die Daten der Meta-Analyse zu verstehen. Ich gebe die Ergebnisse in der folgenden Tabelle wieder. Alle Effektgrößen sind hochsignifikant, daher spare ich mir diese Angabe. Positive Vorzeichen deuten eine Steigerung, negative Vorzeichen eine Abnahme des entsprechenden Wertes an. Der erste Teil der Tabelle gibt objektiv gemessene Variablen wieder. Dann folgen subjektiv gemachte Angaben zu Symptomen und Beschwerden, und am Schluss folgt eine Zusammenstellung vom Vorkommen bzw. von der Häufigkeit von Symptomen. Das Erste ist das Ergebnis von objektiven Messungen. Das Zweite ist das Ergebnis der Erfassung von Beschwerdelisten in Gruppen mit und ohne Masken. Das Dritte ist das Ergebnis von diagnostischen Beobachtungen.

Variable	Effektgröße d	Unterschied FFP2 & OP Maske, Kommentar
<i>Objektive Messungen</i>		
Sauerstoffsättigung des Blutes	-0.24	Niedriger unter FFP2
Atemminutenvolumen	-0.72	Niedriger unter FFP2
Kohlendioxidgehalt im Blut	0.64	Höher unter FFP2
Herzfrequenz	0.22	Nur unter FFP2
Syst. Blutdruck	0.17	0.21 unter OP-Maske
Atemfrequenz	0.01	Sehr heterogen; schwankt zwischen d = -0.72 und d = 0.68 je nach Studie
Hauttemperatur unter der Maske	0.80	Höher unter OP-Maske, nur 2 Studien
Feuchtigkeit unter der Maske	2.24	Nur 2 Studien
<i>Symptome und Empfindungen</i>		
Lästiges Gefühl	1.16	Mehr unter FFP2
Anstrengung	0.90	Mehr unter FFP2
Jucken	2.65	Nur unter FFP2 signifikant, nur 2 Studien
Kurzatmigkeit	1.46	
<i>Symptomenhäufigkeit</i>		Dies sind gemittelte Häufigkeitsangaben über verschiedene Studien hinweg, die die Symptome erhoben haben
Kopfschmerzen	62%	
Akne	38%	
Hautirritation	36%	
Hitzegefühl	26%	
Jucken	26%	
Stimmprobleme	23%	
Schwindel	5%	

Interessanterweise stammen 20 dieser Studien aus den Jahren vor 2020. Das bedeutet: Vieles hätte man schon früher wissen können. Aber immerhin wissen wir es jetzt. Außerdem ist interessant, dass wir diesen Studien zu möglichen Nebenwirkungen des Maskentragens nur wenig entgegenstellen können, was die Nutzlichkeit von Masken anlangt.

Die Autoren erwähnen in der Einleitung, dass die Nutzlichkeit von Gesichtsmasken für die Verhinderung bakterieller Infektionen außer Zweifel steht. Aber für virale Infektionen sind die Belege schlecht. Denn die Maschenweite von etwa einem Mikrometer im kleinsten Fall, eher 5 Mikrometer oder mehr, ist nicht geeignet

virale Partikel mit 300 bis 500 Nanometern oder Aerosole von 1 Mikrometern Durchmesser abzuhalten. Darauf wurde schon [Ä¶fter](#) hingewiesen. Die Daten, die eine positive Wirkung gegen die Weitergabe viraler Infektionen belegen, sind daher denkbar schlecht. Das hatte ich in meinen oben erwÄ¶hnten Blogs schon erwÄ¶hnt.

Interessant finde ich auch die starken Effekte der HauterwÄ¶rmung und der FeuchtigkeitserhÄ¶hung unter der Maske. Denn das kann dazu fÄ¶hren, dass Bakterien und Pilze in der Maske besser wachsen kÄ¶nnen und die RÄ¶ckatmung von schÄ¶dlichen Keimen verstÄ¶rkt wird. Das ist ein oft vernachlÄ¶ssigter mÄ¶glicher Mechanismus fÄ¶r Zusatzschaden. Abgesehen davon, dass auch diese Meta-Analyse, das sagen die Autoren selbst, ein wichtiges Problem, das Einatmen von Schadpartikeln, nicht angehen kann, weil es dazu zu wenig Daten gibt.

Zwischen 2020 und 2022, der Publikation dieser Arbeit, hat es gerade mal 2 randomisierte Studien zur Wirksamkeit von Masken zur Verhinderung von SARS-CoV-2 Infektionen gegeben. Eine war ohne klaren Beleg [3], eine erbrachte einen schwachen Beleg mit vielen Fragezeichen [4]. Die Autoren zitieren eine Bayesianische Meta-Analyse dieser beiden Studien zur Wirksamkeit. Diese ergibt ein nicht Ä¶berzeugendes, medianes posteriores Risiko [\[ii\]](#), also ein Risikomaß, das man nach Kenntnis dieser Daten hat, von 0.91. Das 95%ige Vertrauensintervall dieser AbschÄ¶tzung ist riesig und reicht von 0.63 bis 1.33. Daraus ergibt sich eine 73%ige Wahrscheinlichkeit von einem kleinen Vorteil mit extrem begrenzter Datenlage. Im Klartext: Das Tragen von Masken ergibt einen medianen Vorteil von 9 % (der wahre Wert kÄ¶nnte zwischen 37 % Vorteil und 33 % Nachteil liegen). Das ist ein winziger Effekt, fÄ¶r den wir eine extrem schlechte Datenlage haben.

Nun haben wir aber durch diese Meta-Analyse eine sehr gute Datenlage fÄ¶r den Schaden. Daher greift hier das grundlegende Prinzip Ä¶rztlicher (und anderer) Ethik: *Primum nil nocere* Ä¶? zuallerst keinen Schaden zufÄ¶gen.

Dieses Prinzip, liebe Richter, liebe Bundesregierung, liebe OrdnungsÄ¶mter, lieber Bahnvorstand, liebe SchulbehÄ¶rden, dieses Prinzip wurde in dieser Corona-Krise von Anfang an missachtet. Und man hÄ¶tte es bereits vor 2020 wissen kÄ¶nnen. Jetzt wissen wir es ganz genau. Daher sollte schleunigst mit dem Unfug der Maskiererei aufgehÄ¶rt werden, auÄ¶er vielleicht an Karneval. Denn Dauerkarneval ist auch nicht lustig.

## Quellen und Literatur

1. Kisielinski K, Hirsch O, Wagner S, Wojtasik B, Funken S, Klosterhalfen B, et al. Physio-metabolic and clinical consequences of wearing face masks -Systematic review with meta-analysis and comprehensive evaluation, PREPRINT (Version 1). Research Square. 2022;(22 December 2022,). doi: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2394501/v1>.
2. Kraemer HC, Kupfer DJ. Size of treatment effects and their importance to clinical research and practice. *Biological Psychiatry*. 2006;59:990-6.
3. Bundgaard H, Bundgaard JS, Raaschou-Pedersen DET, von Buchwald C, Todsén T, Norsk JB, et al. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. *Annals of Internal Medicine*. 2020;174(3):335-43. doi: <https://doi.org/10.7326/M20-6817>.
4. Abaluck J, Kwong LH, Styczynski A, Haque A, Kabir MA, Bates-Jefferys E, et al. Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh. *Science*. 2022;375(6577):eabi9069. doi: <https://doi.org/10.1126/science.abi9069>.

## FuÃ?noten

[zurÃ¼ck \[i\]](#) ApotropÃ¤ische Zeichen sind magische, uralte Zeichen, um Ã?bel abzuwenden, wie etwa die KÃ¶pfe der Besiegten, die die Kelten vor ihren Siedlungen aufzuhÃ¤ngen pflegten oder bestimmte Amulette zur Abwendung des bÃ¶sen Blickes. Die letzten Spuren solcher KÃ¶pfe findet man oft noch in den Basreliefs romanischer Kathedralen. Solche apotropÃ¤ischen Zeichen in der Postmoderne machen deutlich, wie wenig modern wir eigentlich sind. Das Wort kommt vom Griechischen apotropein â?? abwenden.

Offenbar hat Frau Dr. Agnes Imhof schon vor mir den Zusammenhang erkannt, dass Masken in der Coronakrise als apotropÃ¤ische Zeichen gelten und dies in zwei Artikeln erlÃ¤utert: [Berliner Zeitung](#) und [tkp.at](#) Es ist meistens ein Zeichen, dass ein Sachverhalt stimmt, wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Richtungen die gleichen Einsichten haben.

[zurÃ¼ck \[ii\]](#) Eine Bayesianische Meta-Analyse ist eine Meta-Analyse, die der Bayesâ??schen Statistik folgt. Die gewÃ¶hnlich benÃ¼tzte Fisherâ??sche oder frequentistische Statistik ist ein Sonderfall der Bayesianischen. WÃ¤hrend die gewÃ¶hnliche Fisherâ??sche Statistik davon ausgeht, dass wir nichts wissen und eine Studie als eine Entscheidung Ã¼ber unser Nichtwissen ansieht, geht die Bayesianische Statistik davon aus, dass wir meistens ein gewisses Vorwissen haben, die sog. â??prior probabilityâ??, kurz â??priorsâ??, also die Ausgangswahrscheinlichkeit, die wir haben, bevor wir eine Studie machen. Wenn wir dann eine Studie gemacht haben, dann haben wir aufgrund des Studienergebnisses die MÃ¶glichkeit, diese â??prior probabilityâ?? anzupassen und in eine empirisch gewonnene â??posterior probabilityâ?? zu Ã¼berfÃ¼hren. Wie das genau geht, sagt das [Bayesâ??sche Theorem](#). Was wir dann am Ende haben sind die â??posteriorsâ??, also die Wahrscheinlichkeit, die auf eine Studie folgt. Ich habe das in [meinem Blog zur Bayesianischen Haltung](#) ausgefÃ¼hrt. Ausgehend von unserer Ausgangswahrscheinlichkeit, hat dann ein Studienergebnis mehr oder weniger starken Einfluss auf unsere Meinung.

### Date Created

10. Januar 2023